

Творческо-практический тур

10 класс.

7. **Фазы геостационарного астероида.** (М.Г. Гаврилов, февраль 2002, редакция апреля 2002.)
Геостационарный спутник всегда "висит" в одной и той же точке неба. То же будет происходить с геостационарным астероидом или Луной.

7.1. Проще всего рассмотреть ситуацию, когда астероид (Луна) «висит» на юге (то есть, в плоскости меридиана). Тогда, если этот объект не находится в тени Земли (это особый вопрос – затмения), ровно в полночь по местному времени будет наблюдаться «полнолуние», в 6 часов утра – третья четверть (астероид или Луна освещается только с восточной стороны), в полдень – новолуние, в 18 часов – первая четверть (объект освещается только с западной стороны). Соответственно, глядя на фазы астероида, можно приблизительно определять время – примерно таким же образом, как мы сейчас определяем, сколько дней прошло после полнолуния или новолуния.

Для ситуации, когда астероид (Луна) «висит» не в плоскости меридиана, нужно будет вводить поправки. «Полнолуние» будет наблюдаться не ровно в полночь по местному времени, а раньше или позже – примерно на столько, на сколько отличаются друг от друга местные времена на меридиане наблюдателя и меридиане геостационарного объекта: раньше, если объект «висит» восточнее, позже, если западнее меридиана наблюдателя. («Примерно» – с точностью до разницы направлений на геостационарный объект из точки наблюдателя и центра Земли.)


Кроме того, в периоды, близкие к равноденствиям, в середине ночи будут регулярно происходить лунные (астероидные) затмения. По ним люди будут определять полночь! (Опять-таки для меридиана, над которым «висит» геостационарное тело. Для других местностей – поправки, аналогичные описанным выше.) Легко оценить, что максимальная продолжительность затмения маленького астероида τ это R_3/V , где V – орбитальная скорость движения Луны (астероида), равная $2\pi(h + R_3)/T$, T – сутки, период обращения, а h – высота геостационарной орбиты, равная

$$h = \left[g \left(\frac{R_3 T_3}{2\pi} \right)^2 \right]^{1/3} - R_3 = 35800 \text{ км}$$

$$\tau = \frac{TR_3}{2\pi(h + R_3)} \approx 35 \text{ минут}$$

Для бытовых целей такая точность определения полночи вполне приемлема. Для Луны продолжительность полной фазы можно вычислить как $(R_3 - R_L)/V$, получим порядка 25 минут, при этом периоды полутени до и после полной фазы будут длиться около R_L/V , то есть примерно по 9 минут.

Приведённые вычисления соответствуют центральному затмению, которое будет происходить в дни весеннего и осеннего равноденствий. В другие дни продолжительность полной фазы будет меньше, а вот периоды полутени до и после полной фазы станут продолжительнее. Естественно, что в какие-то дни будут наблюдаться затмения без полной фазы, только с частной.



Сыктывкар – Красноярск, 7–13 апреля 2002 г.
Сыктывкар – Красноярск, 18–24 ошлӧн 2002.

7.2. Что касается размера астероида, то для того, чтобы человек мог наблюдать его фазы невооружённым глазом, его диаметр должен быть таким, чтобы угловой диаметр был как минимум в несколько раз больше разрешающей способности человеческого глаза. Примем, что это 5 угловых минут, $5' \approx 1,5 \cdot 10^{-3}$ радиан. Принимая, что расстояние от наблюдателя до астероида составляет в среднем 40 000 км (минимально – это 35 800 от экватора, максимально – 42 200 для полюсов, для средних широт – около 39 000), получаем минимальный размер астероида $40\,000 \text{ км} \times 1,5 \cdot 10^{-3} \approx 60 \text{ км}$. Ответ, этот, конечно, вполне условный. Можно считать правильными ответы от 25 до 100 км.

7.3. Приблизительных графиков зависимости от времени звёздной величины Луны в новом положении должно быть как минимум два. Оба – это суточная зависимость звёздной величины Луны. Один случай – для периодов без затмений, другой – с затмениями. Максимальная продолжительность полного затмения новой Луны, как мы выяснили в п. 7.1., будет в дни равноденствий и составит примерно 25 минут, при этом периоды полутени до и после полной фазы будут длиться по 9 минут.

Поскольку Луна приблизится к нам примерно в 10 раз, светить она будет примерно в 100 раз сильнее. Поэтому и максимальный блеск новой Луны в полнолуние будет примерно в 100 раз больше блеска Луны обычной, что есть составит примерно -18^m (большая точность не нужна). То есть величина блеска, соответствующая -18^m , – это на графике будет наивысшая точка. Наинизшая точка в выбранном масштабе будет несомненно нулём с большой точностью. (Кстати, пепельного света новой Луны в новолуние практически не будет – сообразите почему.) В первом приближении величина блеска будет меняться примерно по синусоиде, достигая максимума в полночь и минимума в полдень. Однако, учитывая индикатрису рассеяния, «бока» синусоиды надо существенно «подрезать».


Примечание (от участников не требуется). Так, например, для фазы 90° (первая или последняя четверть) освещённость, создаваемая Луной составляет не 50%, как это было бы при однородном рассеянии, а всего около 8% от освещённости полной Луны! А 50% реализуется для фазы всего около 27° . То есть, реальная ширина пика блеска (определяемая по точкам на «полувысоте») составит не 12 часов, а около 3,6!

Для случая с затмением посередине пика блеска (в полночь) появится резкий провал. В зависимости от конкретного дня (ночи) провал может быть до нуля (полное затмение) или не до нуля (частное). На графике провал будет достаточно резким, поскольку даже максимальная продолжительность затмения в 25-35 минут мала по сравнению с характерной шириной пика блеска.

7.4. Иные последствия – на Земле образуются два огромных приливных горба. Волнами их назвать нельзя, поскольку они будут находиться в одних и тех же положениях – "под Луной" и с противоположной (относительно положения Луны) стороны Земли. Высоты горбов можно грубо оценить в полкилометра.

Ну и солнечных затмений станет гораздо больше (они тоже будут лишь в периоды, близкие к равноденствиям). Эти затмения будут существенно продолжительнее, но менее привлекательны эстетически. По солнечным затмениям люди будут определять полдень. (Вновь для меридиана, над которым "висит" геостационарное тело. Для других местностей – поправки, аналогичные описанным выше.)

8. **Видимость планет.** (Задача сыктывкарских авторов в редакции М.Г. Гаврилова, 2002.) Для полного решения предложенной задачи нужно воспользоваться таблицами эфемерид всех пяти



*Сыктывкар – Красноярск, 7–13 апреля 2002 г.
Сыктывкар – Красноярск, 18–24 апрель 2002 г.*

планет. Предполагается, что участники Олимпиады поймут динамику движения 5 планет по эклиптике и её влияние на условия видимости, обратив внимание на редкое астрономическое явление, когда 4 планеты будут располагаться в одном созвездии (Тельца), а Юпитер рядом (в Близнецах). А также проследят динамику восходов, заходов и установят порядок появления планет, и область неба.

При решении следует учесть $\lambda_{\text{Москвы}}$, 2-ой часовой пояс ($n = 2$) и используемое для расчётов время (зимнее до 31 марта и летнее после 31 марта).

Задача решалась бы проще (нагляднее) при наличии подвижной карты звёздного неба, в данной же ситуации придётся ещё сообразить, как движется в течение суток линия горизонта на данной «неподвижной» карте.


Некоторые конкретные пункты решения следующие:

- 8.1. С помощью звёздной карты можно определить дату, время и место видимости всех пяти планет. На широте Сыктывкара это будет примерно 20 апреля, а в случае Москвы и Красноярска – на несколько дней раньше, что-то около 15 апреля. Так что увидеть это явление во время проведения олимпиады вряд ли удастся как в Сыктывкаре, так и в Красноярске. Дата 15 апреля получается по звёздной карте, когда в момент захода солнца наиболее трудно наблюдаемая планета с наименьшим прямым восхождением α (а это Меркурий) будет выше горизонта.
- 8.2. Известно, что ответы, получаемые по звёздной карте, дают среднее местное время, то есть T_{λ} . Связь T_{λ} с летним временем $T_{\text{л}}$ следующая $T_{\text{л}} = T_{\lambda} + n + 2^{\text{ч}} - \lambda = T_{\lambda} + 1^{\text{ч}} 30^{\text{м}}$. Итак, к показаниям карты нужно прибавлять $1^{\text{ч}} 30^{\text{м}}$. Начало видимости Меркурия в Москве придётся на $T_{\lambda} = 18^{\text{ч}} 25^{\text{м}}$ или $T_{\text{л}} = 18^{\text{ч}} 25^{\text{м}} + 1^{\text{ч}} = 19^{\text{ч}} 55^{\text{м}}$. В этот день и в это время планета будет на высоте около 10° в западной части неба. Продолжительность видимости её невелика, располагается она в созвездии Овен.
- 8.3. Следующее положение по календарной дате это то число, когда все четыре планеты разместятся в одном созвездии – Тельца. Это будет 1 мая, когда Меркурий, движущийся прямым движением, войдёт в границы указанного созвездия. В этот день Солнце заходит около $19^{\text{ч}} 30^{\text{м}}$ по времени T_{λ} или в $21^{\text{ч}}$ по времени $T_{\text{л}}$. Меркурий будет виден на высоте около 15° под скоплением Плеяды.

Продолжительность пребывания планет над горизонтом будет тем меньше, чем меньше её координата α (прямое восхождение). Первым оказывается над горизонтом Меркурий, затем Венера, Марс, Сатурн и, наконец, после полуночи Юпитер.

Интервал времени, в течение которого четыре планеты за исключением Юпитера соберутся в очень компактную группу, весьма мал. Торопитесь наблюдать явление! Это достаточно редкое и красивое зрелище.

Следует также отметить, что в течение исследуемого периода произойдет перестройка порядка расположения планет по эклиптике в силу их разной угловой скорости движения. Известно, что самой быстродвижущейся планетой является Меркурий ($\omega_{\text{Мерк}} = 4,6^{\circ}/\text{с}$), затем идут Венера ($\omega_{\text{Вен}} = 1,6^{\circ}/\text{с}$), Марс... и самый медленный Сатурн. Так, 11 мая Венера догонит Марс по прямому восхождению и расположится на эклиптике чуть к югу от него. Эфемериды Меркурия позволяют выделить две точки стояния в движении планеты, а между ними будет нижнее соединение планеты с Солнцем, когда планета, естественно уже будет не видна. Интересно также, что уже после окончания исследуемого периода времени (в конце мая) Венера обгонит планеты Марс и



*Сыктывкар – Красноярск, 7–13 апреля 2002 г.
Сыктывкар – Красноярск, 18–24 ошлӧн 2002.*

Сатурн, которые прекратят свою видимость, и приблизится к Юпитеру в созвездии Близнецов в начале июня.

Кстати, почему столь компактное расположение пяти планет солнечной системы не называется парадом планет? Дело в том, что по одну сторону от Солнца собрались лишь две планеты (Земля и Меркурий) а по другую остальные четыре (Сатурн, Марс, Юпитер и Венера) причем в достаточно широком конусе. Кроме того, с помощью эфемерид Луны (если бы они были даны участникам) можно было бы определить, что 14-18 апреля, а также 13-16 мая Луна в малой фазе пройдет вблизи пяти планет.